## 庫全書

子部

經氟行疾而國以收此物理之常然也然脾主 仁濟直指 緩弛也夫人四肢百脈 楊經氣行運而關以縱 楊士瀛 朱崇正 附遺 撰

金定四年全書 襲之亦有肢體緩弱之證然則先散其風而後益之於 之 肌肉四肢胃為水穀海所以流布水穀之氣周養一身 此尤當加意 開人之一身筋骨為肚肝主筋腎主骨肝腎氣虚風 )劑與助胃之劑不同亦顧吾活法用之何如耳抑 內由肌內而入脾胃安得不為之緩廢乎若曰驅風 胃既虚肢體失其所養於是風邪襲虚由腠理而 風 緩證 治 那

次已四年在 蘇合香圖用沸湯汽生蓝汁調開吞真料白圓子二十 排風湯衛命湯馬風加製半夏雞心大檳榔增薑煎先 炒黑豆林酒 胖胃肝腎俱虚風入四體筋骨緩弱不仁仍早辰常服 不換金正氣散方見 以此散風毒邪氣 手門二水飲門 日二服治手足風緩或白圓子安骨圓夾用食前服 加川芎官桂煎食前吞安骨圓治 仁精真精

川五電指 白僵藏粉者 白蒺藜粉土科大里一粒金丹治中風昏仆舌湿涎潮癱瘓偏枯預痒大聖一粒金丹治中風昏仆舌湿涎潮癱瘓偏枯預痒 右 作六國金箔二百片為衣令自乾每服一國以生薑 衛香別研各 白裝指 細末合和用松煙墨平西新汲水磨汁搜圓每两 没樂

大龍去般炒 自然銅烧紅醋洋士 虎脛骨酒浸大鐵彈圓治中風靡緩口眼唱斜筋骨擊疼肢體麻木 半两取自然汁磨開温酒半蓋調服蓋取微汗為効 五電脂炒 當歸酒 **當局河浸** 白並 乳香 熟朱砂 白附子处 直僵益炒去 全蝎后去 仁齊直指 半两鳥地內酒浸 8 安息香 川鳥吃大照青酒 沒藥 分培

金分四件全重 妈附散治肝腎氣虚風入筋骨手足緩弱 右為末以酒煮安息香入飛白髮為糊圓彈子大每 右末每一錢黑豆淋酒調下魚用核桃內研酒下 天麻和半 黃耆 圓温酒磨下 灸蜜 Į. 全蝎后分 生草鳥頭吃井倉木炒 防己 川芎 を四 白芷 當歸

シンフーン・ 四斤圓治風寒濕毒與血氣搏筋骨緩弱四肢酸疼痒 痱 前服 食前温酒或豆淋酒下 右為末用浸藥酒調題糊園桐子大每服三四十圓 仁齋直指 熟附子 牛膝蚂

鐵骨丹鐵彈圓 **虎骨酒治諸風緩弱及歷節風骨節酸疼** 名大四斤圓用木瓜煎湯下亦治脚氣 又方加當歸三分乳香沒樂五靈脂各半两麝香一錢 蓋冷則緩之 右挺碎如米每骨一升以酒三升浸五日空心服 虎脛骨酥炙 風方 類並 見 治諸風緩弛其他用藥風類甚

熱生內奏故痺而不任肾氣熱生骨痿故足不任身然 敌足痿不用也或曰手陽明大腸經肺之腑也足陽明 主東骨而利機關也云云故陽明則宗筋縱帶脈不引 治痿獨取陽明陽明者五臟六腑之海主潤宗筋宗筋 脈痿故脛縱不住地肝氣熱為筋痿故宗筋弛縱脾氣 たこううへいう 經曰肺熱来焦五臟因而受之發為痿蹶心氣熱生 附痿證 痿證方論 Į 仁癣直指

屯 我丹溪先生曰內經云諸疾生於肺熟只此一句便見 方金肺也南方火心也北方水腎也五行之中惟火有 就生勉言補寫而大經大法不外於此東方木肝也西 胃經脾之腑也治痿之法取陽明一經何也願明以告 治法大意經日東方實西方虚寫南方補北方此固是 腎雖有二水居其一陽常有餘陰常不足故經曰一 脾土性濕而居中主四肢畏木者也火性炎上若嗜 不勝二人理之必然肺金體燥而居上主氣畏火者 

金方四库生書

たとのうとう 疾之法無出於此縣隆吉亦曰風火既職當滋腎水東 方不實何罪傷之有補北方則心火降而西方不虚何 收不能為用而皆族之病作矣寫南方則肺經清而東 熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏而侮所 慾無節則水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而 坦先生取黄柏為君黃茂等補樂之輔佐以治諸疾而 耶熱之有故陽明實則宗筋潤能束骨而利機關矣治 勝將得木邪而傷矣肺熟則不能管攝一身將傷則四 仁屬真指

熱先哲格言但是患疾之人若不淡薄食味吾知其必 中肯祭矣若将理失宜聖監不治也天產作陽厚味發 相半者有挾氣者臨病製方其善於治痿者乎雖然樂 無一定之方有無疾積者有濕多者有熟多者有濕熱 丹溪云痿證斷不可作風治而用風樂有濕熱濕痰氣 不能安全也 虚血虚疾血濕熱東垣健步丸加燥濕降陰火藥着 术黄冬黄柏牛膝之類温痰二陳湯加倉术白木黃

清燥湯東垣治温熱成處以燥金受温熱之都是絕寒 Radam las **苓黃柏竹歷薑汁氣虚四君子湯加黃芩黃柏蒼术** 亦有食積死血妨礙不得下降者大率屬熱用參术 之類血虚四物湯加黃柏倉木煎送補陰丸为見屋 癱瘓不能動 水生化之源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟 四物湯黃柏之類 錢 倉木钱-仁齊九指 白术

金与じ月生書 健步圖治膝中無力伸而不得屈屈而不得伸腰背腿 右叹咀每半两水煎空心熱服 脚沉重行步艱難 麥門冬 人參 橘皮 麵末 杂胡 稻谷 當歸身 白茯苓 黄連 澤瀉 五味子加 甘草的为各个各个 升麻分三 生地黃

心送下心送下 右為末酒糊圓如桐子大每服七十圓煎愈風湯空 片為東根神兩 苦參一銭 內桂縣 內桂縣 內桂縣 內桂縣 告並 門見

銀定四庫全書 實不痛則為虚曰風曰痿虚實二者而已矣東垣曰 謹按風痿之別痛則為風不痛則為痿經曰痛則為 於經絡之間則那正交攻而疼痛作矣人之氣血弱 氣盛病感氣衰病衰何則人之氣血充質而風寒客 矣丹溪先生曰痿症切不可作風治而用風藥益以 虚而痰火起于手足之內則正不能勝邪而疾痺作 風為實而痿為虚也曰散邪曰補虚豈可紊亂矣乎 F

其腫如脱者為濕多肢節間黃汗出者為風多遍身走 養徹骨疼痛畫静夜劇發如蟲臨者謂之白虎歷節治 福歷關節與血氣搏而有斯疾也其痛如掣者為寒多 **巷節風之狀短氣自汗頭眩欲吐手指攀曲身體魁察** S. 10.2 / 12.2 法當以温藥解其風寒濕之毒或用和平則獨活寄生 風汗出入水或體虚膚空掩設不謹以致風寒濕之邪 其腫如脱漸至推落其痛如掌不能屈伸蓋由飲酒當 **歴節風方論** 仁齊直指

之劑 此證候一名属風須當大作湯圓木可拘以平常淺近 其間不至於頻頻監也書曰若藥弗眼眩厥疾弗瘳似 湯輩可也其白虎恐節遊走癢痛蟲實為之况夫脾主 金好四样全書 肌 **虎骨散治白虎唇節走注痒痛不得屈伸** 肉虚則為癢遇癢而進飲食尚庶祭馬而蟲亦屬飲 **虎腔骨一两半白花蛇肉炎黃天麻** 歷節風證治

处至四事公子 一四 在衛馬衛急車積 右末每服二錢食前以娱豆淋酒調下姓龍去 乳香 沒藥 自然銅月時 羌活 冷防風 僵 牛 蘇 各炒 一去 官桂 兩縣 全蝎焙 白芷 當歸 白附子炮

海 右末煉資料圓桐子大每服十五圓食前温酒下虎脛骨為人兩川獨活四 桐皮散治悉節走注骨節疼痛 川 天 雄 地 安息 董 龍 奉 惠春 縣去 半 麝香分 南星鬼 白僵蠶無少 五電脂 官川鳥 臍去炙净 肞

大己司車之三 日	虎脛骨一两	·	川鳥虎	枳殼製	辣桂	當歸分三	獨活
錢薑五片聚二	<b>虎脛骨 河外黃</b>		松節	海桐皮	牛膝	桃仁去皮	草解鹽水
枚食前煎服 +1		麝香分	防風	白芍藥	麻黄	天麻	川芎

麝香圓治白虎歷節遊走癢痛狀如蟲齒太 金月四月全書 **虎骨酒治歷節諸風百節疼痛力見風** 硫黃酒治惡風頭面肢體瘾疹廷羸 獨活寄生湯治歷節風亦治脚氣亦 者草又研細入酒飲之連日如是硫黃能殺惡蟲自 右每服三錢乳鉢內研細入醇酒再研空心飲其清 透明鋒芒硫黃 門見腰 類見

返認追命再造散治大風厲風 必用歷節属風方治手指學曲骨節間痛甚 古末每服二錢臨夜冷酒調下以淨桶伺候泄蟲如 右用新水二升於磁瓶內浸二樂蜜封七日取出逐 粒 日侵晨面東以浸樂水吞草麻仁一粒七日後添雨 川大黄 微利不妨以療大風亦致 者一两獨生早角刺十郎放敗獨生早角刺一 7 一

敏定匹倬全書 · 白虎風走注癢痛方 能殺蟲方見虚用增味五與湯下空心服風 神授圆治風寒濕合而為痹過身或半身麻木不仁最 與口黑色乃是多年與口赤色是為方近三數日又 雞子指患處咒三過顧送其堆頭益白虎是真神愛 **喫雞子患者下飯用黃腳雞為妙亦可抱雞來歷之** 進一服直候無蟲則絕根也則風疹食人 其餍自止 類見

附諸方 醫畫静夜劇方 欠記回点 /元丁 | W 洗藥方治一切風氣濕氣足脛羸腫疼痛並皆有効 麝香圓治白虎風歷節風遊走疼痛遍身養養狀如蟲 四炒散治歷節痛風走注 右為末每服一錢生薑一大片擂汁入湯調服 蒼耳云卷末 威靈仙五 錢浸 類見 羊角灰二 仁濟直指 白芥子钱 ナニ

大補元丸 金片四库全書 稍温再洗痛處一二次覺痛減如或貧者只用礼 右件用水一桶煎熟於桶內薰蒸滴處出微汗待湯 榆桑椿六件桓枝煎湯洗之亦有神効 荆芥 為耳草 蒼术 青藤 威靈仙 苦參 番白草 生蔥 地榆 防風 煨鹽 麻黄 两各

雨心五汁二角雨炒三酒的煮 梧桐 錢炒兩句 西 浩 破遠初知陳白故智祀母皮术 子大每服七八十 紙二去兩二二酒二去世四 两炒两心 两炒两白浸雨

祛風丸 九用白家湯送下或淡酒薑湯清米飲送下亦可 獨治 可一 黄芩 酒炒的 牙中 奉事生 土地黄河 荆芥而二 雨洗

更時用清茶送下七八十九少許時再服前大補元本件共為細末消打米制為九如梧桐子大每日五本香 白道寇两二 光鳥酒浸去 大香 白道寇两二 大香 大瓜 青藤 少己の巨人こう 愈風化痰丸 何首鳥 - 局 僵 類 仁野直指 光鳥酒 皮浸

金少四月百十 全蝎 獨自黃海姆破森青五各炒一酒樂四五炒酒两五炒 雨 杜 當 防 川 木 陳 荆 南 中 歸 風 鳥 香 皮 芥 星 製 藍 两汁两洗 皮浸 炒 兩各

諸風應劾酒治一切諸般風氣濕痺遍身骨節疼痛紫 2. 7 ! . . . 白凝風神効 右件共為細末酒打米糊為九如梧桐子大母脈 百九空心食前酒送下日服二次 蒼木與四 石連藤 當歸 防風 題點終二 胡麻 白止 川芎 仁斯直指 苦參 何首鳥祭三 細辛錢一 石南縣

右件共為粗末用好酒一場將藥用網袋之懸於亮 以角風 五加皮 大風子 成靈仙 羌活幾二 銀定四厘全書 口下用文武火煮一二時辰取出放於濕泥去火毒 川山甲 白术 白竹藥 崇本 生地黄 黄柏 牛膝 木瓜 知 母

大三司祖 /14.5	天麻	川烏	荆芥	烏藥	入酒末藥方每服煎藥	末藥方於後	住二三日再四
紅字	金銀花	青藤	甘草	白芷			脈每脈加後末藥
防風	蒼术	蒙本	何首烏	木香	鍾加兴末藥八分入酒服之		住二三日再服每服加後末樂入內飲之量力而用

RESERVED TO THE STATE OF THE ST

金片四月全世 右件共為細末入煎藥酒服之効 草鳥 當歸 两頭尖 川芎 石斛 积裁术 麻黄 甘草 人參 分九分九錢六

Charles Julia 18 北海煮酒應致方治諸風氣歷節插腿風年高者亦可 右件共為粗末煮法照前 海風縣三 蘇葉四分 仁雪孔指 木羌木木 九 香 通 八一二一分钱 分钱 分钱 茯苓二食

白乾木五川烏當神 厚 虎 牛 杓 草 砂 人 農 骨 膝 杞 烏 仁 參 多香积川何杏茯 門附裁椒首仁苓 冬子 一儿鳥 心去 錢上 半各

Cial One Links	酥油各五錢	甘草錢五	細辛已此各	天門冬	生地黄	半夏	麻黄	陳皮去
仁清九指	蜜	核桃肉	蒼术	五味子	熟地黃	肉桂	獨活	白术
十九	沈香一錢	紅苴	破战紙	小茴香	防風	白芍藥	羌活	川芎

Company of the Compan

金プログスコー **身不遂遍身遊風白虎歷節疼痛立効** 金刀如聖散治三十六種風七十二般氣口眼歪斜半 後服病在下食前服 安喝內煮熟過五七日方用每服随量飲病在上食 右為細末分作二袋用確盛酒袋懸於確內封灌口 葡萄 山茱萸 巴戟 知母五分錢 地骨皮 砂奶

在研為細末每服五分臨民温茶送下如病長者初門風五錢 蒼术一两 雄黄研 天麻 當歸 荆芥 麻黄根 何首鳥

金好四库全書 分各 錢 沒夢蘇砂門高處去 白芷五分錢 鳥藥房湯 甘草一微 輝 細 辛 雨炒 三各 微水 分一 妙洗

大三日三日 からう 羌活湯治白虎歷節風毒注骨髓疼痛不定亦見 烏頭湯治歷節痛不可伸屈 服八分起至一錢止老弱者只服五六分止 右為極細末臨臥時用温茶送下諒人虚實有力者 两頭尖 川鳥一枚用蜜四合 白芍藥五分 仁齊直指 甘草矣 黄茂各等

金片四月全書 注寒多掣痛濕多則重着治之當辯其所感風寒濕三 **痺是也多由體虚之人腠理空疎為風寒濕三氣所侵** 袖珍方曰凡痺疾病目有五種筋痺脈痺骨痺皮痺肌 不能隨時驅散流注經絡久而為與病者也風多則引 右水煎蜜一合再煎至八分去渣空心服最治脚氣 不可屈伸 附痺症 **殚証方論** 

大王四年人上 証治之宜早為貴乎 五麻湯和前治風寒濕之氣各留則體手足緩弱麻頑 氣注於何部分其表裏須從偏勝者主之藥餌如有此 在上食後服病在下食前服 右哭姐每服四錢水一盖半薑七片煎八分去祖病片子薑黃一两洗甘草微炙 不仁 羌治 白术 仁衛直指 

定左右無留随所至作防風湯主之治行與行走無法風湯宣明風寒濕三氣合為與風氣勝者行與上下 右為末母服五錢酒水各二盏棗三枝薑伍片煎至 黄芩 防風 杏仁少点 秦艽 甘草 葛根终三 桂當兩各歸

处已习上 白小 茯苓湯宣明寒氣勝者為痛痺大宜宣通陰寒為痛宜 通氣温經而愈茯苓湯加減主之 右為末每服五錢水一蓋聚一枚煎至八分温服以麻黄去節各 痛拘倦浮腫 一盏温服 赤茯苓皮 官桂 桑白皮各二 川芎 仁衛直指 为藥 防風 治痛脾四肢疼

茯苓川芎湯宣明濕氣勝者為著與濕地水氣甚重著 金人口月白書 **薑粥投之汗泄為度効矣** 右為末每服四錢半水二盏聚三枚同煎至一盏去 注不去四肢麻木拘攣浮腫 而不去多汗而濡者茯苓川芎湯主之 赤茯苓 芍樂 官桂 當歸 桑白皮 川芎 甘草及分 麻黄 防風 治著碑留

大祖温服	右吹咀每服四錢水一盏半薑五片棗一枚煎八分	甘草或半	防風法 片子薑黃 羌活西半	當歸去羞 赤芍樂 黄芪去	拘急	蠲痹湯亦出手足冷痺腰腿沈重及身體煩疼背項	<b>漳空心温服如欲出汗以粥投之</b>
------	----------------------	------	---------------	--------------	----	----------------------	----------------------

防風湯常生治血痺皮膚不仁 續斷九本事治風濕流注四肢浮腫肌內麻痺 不拘時 右吹咀每服四錢水一蓋薑五片煎七分去祖温服 桂心不雨火 甘草取 杏仁去人人 秦九去蘆 赤芍藥 川獨活兩

黃耆酒方 治風濕痒痛筋脈學急或身體頑痺 とつううへいい 任下 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十九温酒呆飲 川芎七錢 當歸盖 白术 當歸 防風 炒 雲母粉 附子香料 虎骨 仁齊直指 草解两 萆解 沒樂那 茵芋葉 天麻 孟

金克四库全書 茯苓湯方治停蓄支飲手足麻痺多睡時冒 冬十日每服一盏温暖服之常今酒氣相續為住 右叹阻用網袋盛以好酒一斗浸之春五夏三秋七 甘草炎 木香不見 半夏为次 石斛士根 防風 蘆去 各 官桂不見 赤茯苓皮 仙靈皮 白芍藥 赵四 黄者盖去 陳皮西各 川續斷 天麻

次行出事人社会 右吹阻每服四錢水一蓋半薑七片煎七分温服松實去樣 桔梗去 甘草米西 預續圖九本事治寒濕之氣痺滞關節麻木疼痛 白术忠 山芋 麥門冬 防風 續斷 牡丹皮 甘草泉西 意沒仁 乾地黄 鹿角膠 桂心

羌活湯濟 定 右為末煉蜜九如 生治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作 梧桐子大每服五十九温酒空 牛 木 附 子 廣地 酒者 玌 洗去 防風去半泉两人两名 川芎 各 13 木

**設定四車全書** 虎骨散海 治白虎風肢節疼痛發則不可忍虎歷節 者有新久輕重之分有温痰死血之異濟生防風湯 不言痺病盖已中風白虎歷節風條內矣但所言病 茯苓湯所治已露端倪也學者細心求之仁蘇先生 為痛或為痒或為麻痺不仁或為手足緩弱所以然 謹按痺病蓋因風寒温三氣客於經絡為病不一或 右叹咀每服四錢水一蓋半薑五片煎七分温服 た野真指

嗜慾所成苦不自覺腎氣內虚真无不守凡縣立冷地 腎司於下一身之根本繁馬脚者腎之外候也夫人為 熱頭角或身體冷疼或百節拘擊或十指走注或轉筋 久坐甲濕暴熱濯水凌晨履霜感受四氣於冥真之中 不為肺氣者鮮矣肺氣為病雖起於足質周乎身或壯 之見証古人所言病之原因即中属實隱之義也 脚氣 脚氣方論

2.51 學病學疼找者者大過熟煩找濕者腫滿重帶其間四 氣魚有則惟其多者解之對病施樂固在權衡然古人 痛為具耳治法完其所自來校風者遊走有汗挾寒者 惡寒乍寒乍熟傳足六經外證與傷寒類馬但卒然脚 酸疼或 城不城或 腫不腫皆其候也其自汗惡風無汗 便小便多是松溢自腿至膝自脛及踝屈弱頑痒學急 誤忘錯語腹痛下利嘔喉疫涎食氣惡聞見食即吐大 急痛或小腹不仁以至育滿喘息煩悶怔忪昏潰羞明 仁斯直指

異證或因他病而後發或致他病之續生又不可以不 為先盖處乎氣實而死矣然表裏之有異經冷熱之有 涉淋洗皆醫家之大戒也雖然脚氣治法以疏利毒氣 疏導大便使毒氣得泄而後愈但分劑不可過馬其補 以此名為緩風謂其感於風毒所致則總治之法大要 活法矣其或療治不早使毒氣入復衙心攻築作痛鳴 太虚氣乏扶養其中凝陰藴毒為之温利是又智中之 通其變所謂寒則温之熱則寒之在表則散在裏則下

到定四年全書

防風 獨活	_	=	11/1	皆帰 滔浸 川芎	二十四木逕鄉圓治脚氣通用	<b>邦</b> 系登治	滿上氣嘔吐異常此則漸入頓深或者自貽奄忽
續斷環	五加皮	華陰細辛	石南葉	草解鹽水			以者自貽查忽

金定四年全書 木瓜散脚氣通用 右細末酒浸雪糕為圓桐子大每服五十圓細對辣 桂荆芥穗食前煎湯下或枳殼木瓜煎湯下 牛膝酒浸 木香 木香 大腹 川五電脂 Q. 沒藥品 威靈仙 紫蘇 木瓜 茯苓 分研 滴乳香 海桐皮 麻黄素 羌活 陳皮 两半

災定日車在馬 四 降氣湯脚氣通用 禁二两代之 右對散每三錢薑五片棗雨枚煎服如無蘇子以蘇 右細末每三錢薑東煎服 半夏梨 厚樸製 肉桂 甘草炎五两當歸 宣木瓜乾雨 陳皮各三 仁店直指 北前胡各二

生木瓜回脚氣通用 指鄉散治風毒脚氣腫痛 末二錢食前服排風湯通用方見 右童子尿一益醇酒半蓋煎六分憑清來熟調檳榔 右入五積散末和園桐子大日乾每服七十國食前 杨葉 宣州生木瓜白盖竹針插定落 杉木即在一 透去义 其木小去粮以生之葉塞滴

文色の直 Autio 檳榔一物湯治腳氣攻注手足不能舉 止唱湯治脚氣唱逆吐瀉轉筋 煎服治脚心串痛温酒調下 白薑五片煎湯來熟調下治脚氣衝心痛問用童尿 右末每服三錢用紫蘇七葉連梗桶皮一全箇不去 醇酒下 宣木瓜一味細對每服四錢新水煎服神効 雞心大檳榔 上學直指

海桐皮酒治風毒脚氣膝脛疼痛 杉節湯治脚氣攻心痛問脹滿不食 右末用綿最以醇酒一斗春浸七日秋浸十四日每 日空心温服一盏午前一盏 枳殼製 牛膝潤浸 海桐皮 青皮 意改仁两半 防風 丘加皮 生地黄二两杜仲豊製 天台鳥樂 獨 活

方氣紫蘇飲 為門烏藥順氣散 風門 右對每三錢 蓝五片煎 大腹皮 赤茯苓 m \* 半夏製 雞心檳榔 北梗 甘草文分各炒股 积穀製 丁香 見中脚氣通用 門見派 羅萬子做 造香 粉 炒 数 仁 乾杉木節

銀定匹庫全書 **脾約圓治脚氣大便秘遊** 枳殼散疏導毒氣 右末煉蜜圓桐子大每二十圓食後熟水下或販毒 右末每服二錢濃煎木瓜湯調下如要 厚樸製 积殼製五 麻仁明 芍藥 介本 甘草或十 杏仁沒去皮炒枳實製 大黄切魔 一斤蒸 利更加麻

桑白皮炒各 追風毒到散治脚氣熱多證疎泄風毒 大黃湯治脚氣風熱煩悶發渴大便不通 散加大黃通用 右對母服三錢烏梅二箇新水煎服 羌治 两一 木香 升麻分三 郁李仁炒 大黄各半 雞心檳榔 仁齊直指 黑豆两 大黄生分 防風

到 定 匹 库全書 寒則加去節麻黃又治風濕脚氣發熱焮腫加着木檳 豆蘇 柳大黃微利為效 敗毒散方見治脚氣熱證或自汗惡風則加桂無汗惡 木香飲治腳氣入腹攻心嘔悶 如湯治脚氣胃熱煩燥嘔吐敖門 大黄 右對散每服三錢黑豆百粒煎服熱甚大便秘更加 血方 類見 加生甘草治熱證脚氣 加烏梅煎

注沫和劑流氣飲通用为見服 在到散每服三錢薑五片烏梅一枚煎服 2000 / 111 大生木介就帶切盖以正川椒去目吸椒水圆治脚氣寒證 真楠皮 南木香 吴茱萸塩洗七次炒 甘草炎 紫蘇亞東 宣木瓜 青木香 雞心檳榔西 丰田 熟末

越好湯治腳氣風多證 愈定四库全書 小續命多用薑片治脚氣寒多證加獨活治腳氣風多 右研二味為圓桐子大每四十圓温酒下扶虚用核 右到散母脈三錢薑五片棗一枚煎服 桃內煎湯下 麻黄去品 熟附子 甘草泉西 水四 白术 啊一

乾薑甘草湯 疼門加製吳茱萸官桂治寒證脚氣 香薷到散加木瓜煎吞消暑圆治暑證脚氣者可見 たこのかという 獨活寄生湯加陳皮治風證脚氣無熱者皆可服最除 風毒消惡血亦見腰 石南圓治風毒腳腫生瘡或筋攣痛重 川續斷 石南葉 大腹子連皮 意苡仁 赤芍藥 仁頭直指 杏仁殷炒 川芎 赤小豆 圭

金万匹屋石書 證 加 換腿圓治風濕腳氣緩弱痺痛上攻肩背 木瓜湯下 劑除濕湯加檳榔 右 獨活 陳皮 五加皮 細末以酒浸蒸餅研糊圓桐子大每服三十圓煎 单解 當歸 濕方門見 表四 膝两各三 五苓散力見水 杜仲盛製炒 宣木瓜 麻黄 二去 治脚氣渴多 各

を己の百人之う 右末酒穀稀糊圖桐子大每五十圓食前橋皮煎湯 川 積 天 防 牛 石南縣 風 縣 葉 V 宣木瓜四當婦潤浸 南星地 草解 羌活 仁齊直指 加養都養 意设仁炒 黃耆 石斛曜浸 弄

獨活湯 金分四月全書 右旗末每服三錢薑五片聚二枚同煎吞活血應痛 生地薑 白芍藥 羌活 木香等 辣桂 人參 當歸 杜仲豐製白茯苓 麻黄毒 川芎 总四 黃耆蜜 白术 甘草炙 牛膝 熟附子

CANDING AIR 活血應痛圓 圓 治腎受風冷脚氣酸疼及久痢登厠風冷入于腸胃 右末酒麵稀糊圓桐子大每服二十圓用獨活湯下 以致两脚削小成鼓槌風而痢又不止用此兩樂俱 狗脊原去毛 没海草鳥頭二十四两 倉木两六 沒樂川两 香附之炒 仁齊直指 两杆 净 陳皮五 威靈仙 两 圭 兩二

動坑四庫全書 不老地仙丹治腎臟風毒輕脚肚筋 效 黄 蒸 虎骨 青酒 炎 數 數 數 炎 當歸 羌活 沒藥月分研 川芎兩一 真川椒去目 圓白南星 獨活 防風 卷四 炮 川草解鹽水 白附子炮 杜仲薑製 何首鳥 赤小豆

烏蛇圆治風寒脚氣隱痛痒痺 卷於國治風寒脚氣隱痛痒痺 たこりうとふう 煎防下前恐怖树圆桐子大每服四十風木瓜橘皮 血竭 乳香料 仁衛負指 ा का 8 木鼈子上 没 作

慈濟國治脚氣遊走兩足轉上腰腿疼痛不能轉侧 湯下 右末酒髮稀糊圓桐子大每服四十圓木瓜橘皮煎 乳當 木香皮 川芎和半 意设仁

次年日 1 大流氣飲加當歸下为見眼 四斤圓治腳氣緩弱隱疼及肾虚感受風寒濕痺風緩 送下 右細末酒髮稀糊圓桐子大圓數四十食前紫蘇湯 老白膠 赤小豆 铈研 茴香炒 牛膝 川五靈脂分三 仁嘴直指 地龍土大 天台鳥藥西 三九

者二陳湯下養正丹文瓜圓於門肾 金液丹亦門將治凝陰蘊毒温而利之養正丹通用以虎骨散節門應脚氣筋急掣痛用木瓜橘皮煎湯調下 脚痛緩弱患在風濕風證以烏樂順氣散加麻黃白並 积殼木瓜檳榔煎湯下 主之濕證以不換金正氣散加茯苓生乾薑主之一比 二陳湯加檳榔細辛製积設治脚氣處多證亦門無熱 収功容易事也若夫腎虚為病脚弱而痛又當何如曰

附踏方 夾和白圓子佐之余每見腳氣緩弱人多服四斤圓亦 腎主骨故爾惟安腎圓最良以不換金正氣散送下仍 安腎圓輩也然則腎氣充則骨氣殭骨氣殭則無緩弱 麻黃左經湯声因治風寒暑温流注足太陽經腰足掌 之患治法要當究其原 こううしょう **痺關節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛** 

**動定四库全書** 半夏左經湯方因治之小肠經為風寒暑濕流注發執 桂加杏仁澤瀉並各等分 自汗去麻黃加肉桂芍藥重者加白术陳皮無汗減 右為末每服四錢水一蓋薑三片棗一枚煎空心服 桂心水浸米 防風分等 麻黄 羌沽 茯苓 乾葛 甘草矣 細辛 防已

腰脇疼痛頭目眩暈嘔吐不食 右叹咀每服四錢水一蓋薑三片棗一枚煎七分空 心服熟問加竹瀝鳴急加杏仁桑白皮 乾薑 甘草矣各 半夏湯洗 茯苓 白术 乾葛 桂心不見 麥門冬 黄芩 仁齊直指 細辛 柴胡 防風 小草 里

多方匹件全書 大黃左經湯声因治風寒暑濕派注足陽明經使腰脚蜜片四峰生 赤腫痛不可行大小便秘或惡聞食氣喘滿自汗 心熱服腹痛加芍藥秘結加阿膠鳴急加桑白皮紫 右叹咀每服四錢水一蓋薑三片棗一枚煎七分空 大黄蒸 杏仁去皮尖别 細辛 苗去 甘草矣 厚樸去皮 茯苓 前胡 羌活 黄芩

たこのにといい 大料神秘左經湯片用治風寒暑温流注三陽經腰足 拘擊大小便松遊鳴滿煩問重皆治之 蘇小便遊少加澤寫四肢瘡瘍浸淫加升麻並等分 白薑 麻黄 単夏湯 おき 次洗 桂心 防己 积 學 養 學 製 製 製 製 製 羌活 乾葛 仁齊直指 甘草矣 小草即遊 防風 茯苓 細辛 里

金灯巴尼石雪 桂 右叹阻每服四錢水一蓋薑三片棗一枚煎服自汗 物附子湯方用治四氣流注於足太陰經骨節煩疼 大便秘加大黃竹歷鳴滿加杏仁樂白皮紫蘇拉等 加壮蠣白术去麻黃黃腫加澤寫木通熟甚無汗減 四股拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫 分對證加減尤宜審之 柴胡 加橋皮前胡升麻腹痛或利去黄芩加芍藥附子 黄芩

當歸北痛湯放粹治濕熱為病肢節煩疼有背沈重胸 次三四年全等 右叹咀每服四錢水一盏薑七片煎六分食前温服 不利及遍身疼痛下症于足腔痛不可忍 甘草東皮牌去 羌活 茵陳 五钱 1 甘草矣 白术西 葛根 桂心 人參盖 仁齊直指 防已 蒼朮銭各 黄芩酒 升麻 两各四 四十二

烏樂平氣湯方 治脚氣上攻頭目昏脏腳膝酸疼行 步艱苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之 右叹咀每服 白术十分 茯苓炒 防風盡去 當歸 一兩水二蓋煎至一蓋去浑空心服 澤寫 甘草炙 當歸身 白术 对各法酒 白芷 川芎

龙色日南人山 東坦羌活導滞防治脚氣初發一身盡痛或股節腫痛 脈 便消阻隔先以此藥事之後用當歸北痛湯 右叹咀每服四錢水一盏薑五片聚二枚煎七分温 當歸卷三 羌活 五味子 人參 7 烏藥去水各 大黃酒及煨 獨活 仁斯九指 积實炒二 乾木瓜 防己 阿枯

金匱八味丸治足少陰經脚氣入腹腹脹疼痛上氣喘 金月四月全世 加味敗毒散治足三陽經受熱毒氣流注脚踝上城亦 不旋連有門 急腎經虚寒所致也此證最急以腎乘心水粒火死 右攻阻每服五錢或七錢水煎服 腫痛寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒 柴胡 羌活 か見補 积殼 獨 活 前胡 桔梗

健步丸方見 欠三可引 ここう 五積散和南治寒濕派注兩腳酸疼有無痰氣者用之 尤宜內加木瓜多月 右叹咀每半雨入薑煎 陳皮 生毕 川芎 甘草 雨卡 倉术 歸尾 大黄 仁隣直指 中 斗 膝 两各 ち樂 蒼木等 茯苓 翠五

防已飲丹溪 金石四件全書 木通湯下 右為末蒸餅丸如梧子大每服一百丸空心煎白术 吳茱萸 白术 檳榔 大腹子筒 犀角 蒼木照 條本西半 川芎 木通 桂枝线二 甘草稍 生苄 防己

脚氣治例 こととのはしたころ 心法附録曰腳氣有濕熱有食積派注有風濕有寒温 大便實加桃仁小便溢加杜牛膝有熱加黃芩黃連 或當歸指痛湯心腳氣氣鬱甚者升車丸除濕丹有 專主乎濕熱先生別有方 ○勝濕以仙术白术防己川芎為主或六物附子湯 大熟及時令熟加石膏有痰加竹歷薑汁如常腫者 黄柏各河 仁味真指 型

等樂隨經選用有無痰氣寒濕者五積散加木瓜 若味風養血用獨活寄生湯最效〇春夏魚溢腫而 若雙解以大黄左經湯東垣羌活導滞湯 滴者用香蘇散加五加皮木介檳榔川練子○熱而 若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加 飲者東垣開結導鼓九○脚氣解表用麻黃左經湯 紅種者敗毒散如木小蒼木〇秋冬已後用五積散 黄柏南星或 健步丸

除濕丹俱見 大型 DIDL Auto 五積散寒方 舟車九 四物湯方見補 附足跟痛 丹溪曰○有痰有血熱○血熱四物加黄柏知母牛 之類有痰晦者五積散加木瓜 加木瓜牛膝檳榔吴茱萸 門見 中 仁樹直指 四十二

開結導飲九方見痰 金万里屋有電 去浑空心熱服 器內慢以零炒焦存性研細每服一錢至二錢木瓜 一脚轉筋疼痛擊急用松節二兩對細乳香 為直指卷四 同木瓜白芍藥官桂當歸甘草酒水各半 疼痛用金銀花為末每服二錢熟酒調 一錢以

欽定四庫全書一冊直指卷五

詳校官太醫院更目臣宋 桂

編修臣倉聖脈覆勘

校對官主簿臣汪 覆校官中書臣朱 腾舒監生 臣張 日對 鈴 炳

にこじょ ハイ 禁衛之所以運轉者氣也五臟六腑之所以相養相生 **苦取問以梅核氣積聚凝聚店**地 諸氣方論 古指卷五 4 降者氣也血脈之所以流行者亦氣也 仁職直指 則機緘窮一毫不續則穹壤判 明 楊士瀛 朱崇正 撰 附遺

屯 其間 惠喜爱愁或以為喜怒憂思悲驚恐皆通也然則均 者亦以氣也盛則盈衰則虚順則平逆則病氣也者獨 多好心库全書 是氣將何先馬曰氣結則生痰痰感則氣愈結故調氣 如絮如膜甚如梅核室礙於咽喉之間略不出燃不下 非人身之根本乎人有七情病生七氣七氣者寒熱怒 必先豁痰如七氣湯以半夏主治而官桂佐之益良法 况夫冷則生氣調氣雖用豁痰亦不可無温中之劑 用桂又所以温其中也不然七氣相干痰涎凝結 **先** 

中以至五精六聚亦癖寂寂心腹塊痛發即欲絕始無 香園一族結者三因七氣湯指迷七氣湯易簡二陳湯 往而不至矣一冷氣者生冷傷脾風冷入胃或血海虚 或中滿縣食或上氣喘急口氣隔口氣滞口氣秘口氣 た。日のシンスト 散加半夏茯苓〇上氣者氣逆而上呼吸喘促分氣紫! 木香大流氣飲指迷七氣湯順氣木香散三和最五皮 冷冷則生氣用和劑七氣湯治中湯沈香降氣湯大沈 一中尚者痞滴不食水氣腫脹面目俱浮积殼散加南 一件官直指

蘇湯蘇子降氣湯或嚼蘇合香圖以秘傳降氣湯送下 殺腰痛俞山人降氣湯為方七氣湯加桶核或辣桂煎 或五皮散加桂吞青木香間曷方流氣飲加赤茯苓枳 高寬中散和劑七氣湯加木香縮砂間以紅圓子佐之 ○氣隔者陰陽不和中脫室塞五隔吐陰食不能下五 開則墜痛脹滿用異香散調氣散沈香降氣湯仍與神 保国或少達煎因利之浮腫用三和散夾生料五苓散 氣滞者滞於肖膈則脹淌滞于手足則浮胆滞于腰

たとのたんこう 氣順而蘇即以治中湯加木香以和其中使氣歸常道 為氣中不得誤用風樂及通關利腠等華先以薑汁泡 若更不能調則氣逆而厭又有變證〇五積者五臟之 湯調蘇合香圓次用七氣湯大流氣飲加石菖蒲繼之 遂成氣中狀如中風仆倒昏迷牙關緊急只是無痰此 麻仁圓並用积殼散送下○氣疾之人多因氣不歸元 大便不通蘇合香園夾和感應園或楊氏麝香園局方 湯點調氣散吞青城九○氣秘者停宿不消肠胃留滞 仁所直折

意國頂珠園酌量用〇又一證經源作聲腹中經帶他 所積其病難醫六聚者六腑之所聚其病易治挟水為 百病自聽氣填嘔惡全不入食入食則吐痰涎或一塊 湯送下或少與達煎圓撞氣阿魏圓三稜煎圓重者如 舜挾血為濺氣血水飲皆能結塊輕者神保圓以衛香 婦人平時任氣易為七情所傷適月事經季不行一身 無所苦此為水飲消飲回倍木圆水飲販一薑圓夾和 用之〇人有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常一 SCHOOL STATE TO SELECT THE ASSESSMENT OF THE SECOND SECOND

至天上上一十二

できること 如核室塞胃喉而痛或一塊如卵築觸心下而疼或腹 孕婦做得百般病者此也用藥但以二陳湯加縮砂枯 能行小便白濁浮油帶下淋瀝日就瘦弱全似虚勞然 中塊物動而作痛攻剌腰背時發開熱四肢之力脚不 梗薑聚烏梅同煎半夏理氣消痰縮砂安胎順氣北梗 而穀雖不入果子雜物常喜食之却只是有孕該所謂 必煩病無由愈白濁一節謹勿燥流二陳湯加白茯苓 以開育喉之隔服之自然安平若妄以剛劑温胃胎氣 仁齊直指

**到好四牌全書** 食 故曰產前安胎產後調氣患者觸事勿怒飲食勿故回產前安胎產後調氣男女或有胸喉間梅核 惟核膜上塞咽喉甚者攻擊滿悶欲絕產後尤多有之 以下白圓子炭延期可也若夫七情所發遊氣填胸不 和劑七氣易治七氣所傷處涎結聚心腹刺痛不能飲 甘草两 諸氣證治 , 炎半 五製 人參 辣桂去羅皮 冷作

2000 225 和劑治中湯方見牌 證 沈香降氣湯治陰陽交滯心腹脹滿留飲停酸積冷諸 食前服 右剉散每服三錢水大盞薑五片棗一枚煎至七 分 右末每一錢鹽 香門一步 -一點沸湯點下 縮砂仁兩 仁齊直指 甘草啊燈

金方で库全書 大沈香圓治一切冷氣攻心腹刺痛胃肠噎塞婦人 易簡二陳湯并見 三因七氣湯證治如前有熟者可用此 氣刺痛並宜服之 魚類心 時服 右對散每服四錢水蓋半薑七片棗二枚煎六分不 紫蘇葉西 半夏五 P 凝 茯苓两四 厚模製 血

炎皇司·平全公司	草果仁	檳榔	木通二	厚樸製	橘红	和削流氣飲調	积鼓散方見即
人參	逢术照	辣桂	大腹皮	香附沙	青皮	流氣飲調禁衛利三焦行痞滞消腫	治證同前加南木香煎服
白术	霍香葉為一	木香	丁皮	甘草丸各	紫蘇葉	<b>活滞消</b> 腫脹	木香煎服

指述七氣湯治七情相干陰陽不得升降氣道壅滞攻右對散每服三錢鹽四片棗二枚煎服維見水白莊 半夏東 积殼製各 街作疼 青皮 益智仁两一 逢我术 赤從苓 香附一两 辣桂 表丘 甘草分三 藿香 桔梗 石菖蒲

*		沙里四車至書
	桔梗多等	丁皮
蒼木炒	甘草盤	厚樸追汁
橘紅	辣桂	縮砂仁
茴香炒	乾薑 炮	良盖
	今證腫脹泄寫	順氣木香散治冷證腫脹泄寫
		時服
一蓋薑四片棗一枚煎七分不	一錢水一蓋薑	右對散每服三錢水
-		加半夏蒙三

三和散和暢三焦治痞脹浮腫 五皮散治皮屑水氣 右末每二錢半薑聚煎食前服 右羅末每二錢煎服加赤茯苓可以和氣利水 宣木瓜姆 大腹皮炒 陳桐皮去 川芎 羌活两各 紫蘇亞葉 木香 檳榔品紅煨 甘草炒 白术 沈香

分氣紫蘇湯治腹骨疼痛氣促喘急 右八味吹咀為應本秤二十斤净入揀城枝葉乾紫 右羅末每三錢煎服 桑白皮 大腹皮 头质皮 头 大股皮炒 生薑皮 甘原梅梗 對 有人 多多光 陳福皮等 桑白皮炒 草果仁 茯苓皮 茯苓


**金定四座全書** 蘇子降氣湯治心腹脹滿喘促短急 錢三片入鹽少許同煎至七分去潭空心食前服常 蘇十五斤操碎同一處拌与每服四錢水一大蓋薑 服和胃進食 右為攻咀每服二錢至三錢水一大益生薑三片煎 皮一胡 子 不馬薦去炒淨 見去 火魔 陳皮去 川當歸去產 半夏光七次各甘草成二 **巻**五月 厚樸多一兩

とこうるという 瘧赤白暴利察血月閉疹癖丁腫態痛思忤中人小兒 蘇合香國療在忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣思點瘴 吐乳大人抓捏等疾成類 秘傳降氣湯治同前 至七分去浑温服不拘時常服消痰飲散滞氣進飲 食 五加皮甲炒黄色 骨碎補與炒半两 仁蘇直指 积殼樣態炒 浄 九

金与四月百十日 煎七分食後通口服痰嗽加半夏麴煎心肺虚加 炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虚加當歸煎 右為獲散和勻以碗盛就飯觀上蒸一伏時傾出攤 參茯苓煎上膈熱加北黃苓煎下部大段虚加少許 令冷収之每服二錢紫蘇三葉薑錢三片水一蓋 同 陳皮一两 地骨皮半 半夏半两生為末生薑自 黄两 妙 訶子 桔 梗 半炮 色雨 炒肉 炒 甘草炒 桑白皮二 草果去皮膜半 啊 柯

沙芝四年全十 異香散治腹肠膨脹痞悶噎塞吃氣吞酸一切氣痞腹 血積氣諸般血殿氣塊方見疾 紅國子治丈夫脾積氣滞貿膈滿問酒積不食婦人 脾 五肠宽中散治七氣留滞飲食不下穀脹氣脹通用 右為末每三錢鱼三片鹽一點煎服 陳皮各二 縮砂仁 白豆寇仁 川厚楼蓝汁 甘草炎 丁香 仁州直指 香附四两 青皮 木香

中刺痛 全次でたろう 調氣散治氣滞不勻宿食不消 煎七分通口服不計時或鹽湯點或鹽酒調皆可服 右為細末每服二錢水一蓋薑三片棗一枚鹽一捻石運內雨 厚樸去黨店員 京三稜根各 白豆蔻門 厚樸去處皮薑 丁香 益智仁 陳皮去白各 甘草塩 檀香對



皮糯米飲下腎氣脇下痛炒尚香酒下大便不通蜜 **薑醋湯下肺氣盛者白裝蛤粉各三分黃丹一分同** 膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒 能去之有人病項筋痛諸醫皆以為風治之數月不 漿飲任下諸氣惟膀胱氣肠下痛最難治獨兴樂輒 湯調檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒 研為散煎桑根白皮糯米飲調三錢下小喘止用桑 蹇乃流入背膂久之又注右脇擊痛甚苦乃合服之!

達煎圓利大府去積氣 **圆至十五圓生薑湯下婦人淡醋湯下不拘特候更** 右為末入膏內同醋髮糊為圓如梧桐子大每服十 為透硼 川 線 婦 科 子 投而差後當再發又一投蹇 船上尚香 焙雨半 校夫 炒 雅胰 後我本本小京三稜 孝 附子处府 檳榔 Er Pragi 山藥两二次般養人 逢我术 而醋魚 同砂 热并 石宿 去 令四

欽定四庫全書 生料五苓散去水退腫 量虚實加減常服順氣寬中消積滞化痰飲 裏身發黃直濃煎茵蔯高湯下食前服疸病發渴及 中暑引飲亦可用水調服小兒加白术末少許如發 右為細末每服二錢熟湯調下不拘時又治察熟在 虚熟加綿黃者人參末少許 白术去產多一 桂去魚皮 稻谷皮去 赤茯苓皮

た正可見たは 俞山人降氣湯治氣不升降疫實喘滿 子一枚同愈七分去浑食後服 右為末每服三錢水一盈半紫蘇三葉生薑三片東 桔梗炒 黃者去蘆各 半夏麵夫炒微 五加皮塗头 當歸流去 甘草美蓝去 羌活 仁齊直指 厚樸蓝汁浸 桂心不見 橋皮去 ナニ

麻仁圆順三焦潤五臟治大便秘塞不通年高人尤宜 感應圓治積冷傷胃腹脇脹痛 青娥圓治氣滯不散魚治腰痛 服之 淡醋湯下常服壯筋骨活血脈鳥髭鬚益顏色 右為細末蒜膏為圓每服三十圓空心温酒下婦 杜中當汁浸炒 妙胡桃二十 皮 殺箇 满方 門見 脹 蒜 熬凶 膏兩

撞 研浸 末宿


砂七錢為衣丈夫氣痛炒魚隨湯下一粒至二粒婦白芷炒各 生薑四两切作戶子用鹽白芷炒各 生薑四两切作戶子用鹽白芷炒各 生薑半两海一宿炒黑色 刺 首香 香り 陳橘皮洗 達我术心

大便不調或泄或秘 火にの車をいる 三稜煎圓治中脫氣痞心腹堅脹智中痞塞喘滿短氣 人血氣醋湯下常服一 仁衛直指 粒爛嚼茶酒任下 大成龍 高子 立

金写じるとい 香橘圓治七情所傷中脫不決腹肠脹滿 一蓋圓養脾温胃去冷消痰大治心脾疼痛宽育下氣 至二十圓温米飲下食後服 右件等分為細末髮糊為圓如梧桐子大每服十五 切冷物所傷 至二十圓食後橋皮湯下孕婦不宜服 香附炒 良薑去 乾薑炮 橘 紅两各

**薑桂散治心中卒痛腹肠氣滞** 桔梗积殼湯治諸氣痞結滿問 こうしい 右末每一錢温酒調下 右對散每四錢水產半薑五片煎至中產温服 右對散每三錢蓝五片聚二枚煎服 辣桂 甘草 枳 殼製 桔梗多二 川白薑不炒各逢我木两 仁謂直指 甘草两半 ナ

霍香葉	木香	丁香	草果仁	白豆蔻仁	沈香	拒	<b>沙香開膈散治五</b>
半夏麵	白茯苓	人參	益智仁	華澄茄	荆三棱		膈散治五膈五噎痞滿嘔吐心腹
青皮	香附炒	丁皮各半	川白薑	縮砂仁	達莪术		吐心腹刺痛肠肋脹



弘定四库全書 白豆蔻散治七氣所傷滞於胸膈室於咽喉脹痛于心 如意圆治積聚塊痛疝瘕瘕癖等疾 下噫氣吞酸不能飲食 右末每三錢水一盏薑三片鹽一 厚樸製 青皮 白豆寇仁 丁香 香附三分分 陳皮 縮砂 木香 捻煎七分不時服 華澄茄 甘草 辣桂谷二 一炒分各

次已日日 1 右末研細水煮麵糊圓麻子大每服二圓加至三圓 荆三稜 達我术 內豆蔻 料 止温酒送下 川白薑炒 砌半月沒 華澄茄 大戦 沈香 牵牛炒取 史君子 雄黄 桃仁炒 木昏 仁濟直指 內豆蔻地利 五靈脂炒 辣桂 沒藥 大丁香 ナハ 各

頂珠圓治積氣塊痛久年脾積癖寂之疾 金りいるという 痛最難治此藥主之 楊氏麝香圖治停宿積聚能尋諸處痛凡膀胱氣肠下 先嚼煨薑如指許照下次以冷熟水吞藥不得嚼破 右末陳米飯為園桐子大輕者一圓重者二圓臨睡 上項內囿子請酌量用 砌砂醋浸半 木香 H 来砂研細各 丁香 巴豆姜油 淡豉

橘皮一 及巴马里/三 儿酒食所傷中院妨滿嘔吐吞酸悉療之 **腎氣脇疼尚香酒下大便秘蜜湯下** 熟水下心腹痛研煨薑泡湯下血痛炒薑醋泡湯下 右為末湯泡蒸餅糊圓麻子大朱砂衣每三圓常服 麝香 全揭故步 陳橘皮洗净新汲水煎服屢效 一物湯治諸氣攻刺及感受風寒暑濕初證通用 巴豆去皮心 仁齊直指 胡 椒两各 十九九

便 分心氣飲真方治憂思鬱怒諸氣痞滿停滞通利大小 脇 氣塊石燕散治飲食傷冷心下結塊狀如伏梁又攻左 金人巴人名言 规 右為末每服二錢臨發時沸湯點服車蛾蛤蜊殼治 乾薑生 車蛾殼 官桂 蛤蜊殼為末各一两 悉五 甘草 炙各 一分

煎七分不時服里人瘴瘧經年虛腫腹脹食不知飽 右對散每服三錢水大蓋薑三片棗二枚燈心十並 桑白皮炒 青皮去 麥門冬去 香附 南木香 紫蘇芝葉西 半夏製 檳榔 藿香香 陳楠皮 桔梗 木通節去 仁蘇負怕 達我术根 甘草炙一 辣桂 赤茯苓 大腹皮 积殼製各 啊

銀定四庫全書 杏 結致有斯疾耳治宜導爽開鬱清熱順氣如半夏陳皮 核之狀者是也始因悉怒太過積熱為隆乃成隔痰鬱 梅核氣者室礙于咽喉之間咯之不出嚥之不下如梅 通其病頓愈 以此樂吞温白圓照浮初則小便數次後則大便盡 附川芎山枝仁黃苓积殼蘇子之類是也如老痰凝 附梅核氯 梅核氣方論 P.

結不開以酸較之堅海石是也 とこしりる ハシラ 加味二陳湯 徐徐服 右㕮咀每服五錢加生薑一片水一蓋煎六分食後 半夏 真蘇子 甘草 山栀子仁各等 **\*\*** 黄芩 陳皮 桔梗 仁癣直指 茯苓 枳殼 白豆蔻仁

附積聚癥癖痞塊 **積聚廢癖落塊方論** 卷五

潘凝潘則寒氣上入于腸胃則順脹順脹則腸外之汁 經云積者蓋厥氣生足悦悦生脛寒脛寒則血脈凝

節 沐迫聚不得散日以成積卒然多飲食則腸滿起居 用力過度則絡脈傷陽絡傷則血外溢血外溢則如 不

血陰絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血 於腸外有寒汁沫與血相轉則并合凝聚不得散

溢

內

大三日ラ ハン 大衛直指 名曰伏梁起牖上大如臂上至心下久不愈令人煩心 六射不通温氣不行凝血温表不散津液凝濇渗著而 成積矣或外中於寒內傷于憂怒則氣上逆氣上逆則 胖之積名 曰痞氣在胃脫右側覆大如盤久不愈令人 杯有頭足久不愈令人發發逆症症連歲不已心之積 右肠下大如覆杯久不愈令人酒淅寒熱喘咳發肺壅 不去而成積矣故曰肝之積名曰肥氣在左肠下如覆 四肢不以發黃疸飲食不為肌膚肺之積名曰息奔在

府久不愈令人喘逆骨疾少氣 腎之積名奔脉在小腹上至心下若脉狀或下或上無 生聚者六府所成也積者陰氣也其始發有常處其痛 動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所 難經曰積者除氣也聚者陽氣也故除沈而伏陽浮而 其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚故 不離其部上下有所終始左右有所窮處聚者陽氣也 以是別知積聚也矣

熱於小腸調內熟相搏則血移而為伏寂血澁不利 次足刀車上 假也假物而成形然七盛八瘊之名經論亦不詳出雖 陳無擇云殿狼屬肝部積聚屬肺部大殿者堅也狼者 事沈滯而不行故云為愛癡為愛與伏同傳寫誤爾 血内凝而為寂也小腸移熟于大腸乃為虚寂大腸移 聚忽散無其常故其病未及殿也經曰血不流而滞故 原病式曰癥者腹中堅硬按之應手然水體柔順而今 反堅硬如地者亢則害承乃制也般者腹中雖硬而忽 (10) 仁濟直指 月

氣血而成古人謂為痼疾以蚊蛇等為生瘕然亦不必 有蛟蛇鼈內髮強米等七證初非定名偶因食物相感 胃氣強積自消矣潔古之言豈欺我哉內經曰大積大 留聚假血而成自有活性亦猶永嶽中僧病噎者腹中 滿座皆君子縱有一小人自無容地而出令其真氣實 有一物其狀如魚即生瘕也潔古云養正積自除譬如 光此並屬血病蛇髮等事皆出偶然但飲食問誤中之 而致患爾若婦人癥瘕則由內外不內外因動傷五臟

當用消積樂使之融化則根除矣又云氣不能作塊成 審馬丹溪云凡積病不可用下樂徒損真氣病亦不去 行氣開炭為主用海石三稜達术用醋煮香附桃仁紅 飲在右為食積在左為死血大法鹹以軟之堅以削之 况虚中有積者乎此乃治積之一端也那正虚實宜 詳 聚衰其大半而止滿實中有積氣大毒之虧尚不可過 花五雪脂之類為丸石照白术湯送下 聚塊乃有形之物也痰與食積死血而成也在中為痰 三

二新五百

一致定四庫全書 一 丹溪方治一婦人死血食積痰飲成塊在兩肠動作雷 凡婦人腹中有塊多屬死血 鳴嘈雜妝運身熱時作時止 右為末蒸餅丸如梧桐子大每服五十九薑湯下 黄連来竟一半以益智半两同 萊菔子 十两 三棱 桃仁各五錢 香附童便浸 莪术 台芎 煮醋 麥麵 梔子 山查 炒去益 兩同妙 智

最難治此藥主之見前諸氣門 撞氣阿魏圓治五種噎疾九般心痛疼舜氣塊冷氣攻 散治氣滞不与宿食不消紅圓子治丈夫脾積氣滞曾 刺如意圓治積聚塊痛在寂在察等疾頂珠圓治積氣 氏麝香圓治停宿積聚能尋諸處痛凡膀胱氣脇下痛 塊痛久年脾積癖寂之疾達煎圓利大腑去積氣調氣 とこうシーニー 膈滿悶酒積不食婦人脾血積氣諸般血殿氣塊氣塊 石煎飲治飲食傷冷心下結塊狀如伏梁又攻左脇楊 至五

金万四月至書 肥氣圓東垣治肝之積在肠肠下如覆杯有頭足久不 愈令人發放逆瘡瘧連歲不己 右件除茯苓阜角巴豆霜另末外為極細末和勻煉 白茯苓一錢 厚樸五 椒 川鳥頭地去皮臍 錢四 甘草文美钱 昆布各二錢 黄連线 乾薑分五 卷五 中角去处 五个 廣木地 柴胡 兩二

火芝四里人 伏梁圖治心之積起臍上大如臂上至心下久不愈令 大半勿服 蜜為丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二 人煩心 丸漸漸加至大便微鴻再從二加服周而復始積減 黄連 菖蒲 黄芩矣 一雨 To the second 厚樸製 巴豆霜 桂銭一 仁獨直指 人参各五五 紅豆 乾薑 主

店氣圓治脾之積在胃脫覆大如盤久不愈令人四肢 右件除巴豆霜外為細末另研豆霜旋旋入末煉蜜 為丸如桐子大服如上淡黃連湯下 不收發黃疽飲食不為肌膚 厚樸四錢 黄芩钱 黃連线八 吴茱萸三 丹参少多 人多钱

たんとりゅうたい 息責九治肺之積在右脇下覆大如杯久不已令人洒 為丸如桐子大每服用淡甘草湯下服如上法 淅寒熱喘效發肺壅 右件除豆霜另研茯苓另末旋入外同為細末煉蜜 厚樸製八 乾薑與半 白茯苓 巴豆霜 黃連三线两 桂 [ונ 仁齊直指 各四 乾薑炮 白术

金石四月全書 **奔豚九治腎之積發于小腹上至心下若豚狀或下或** 右件除茯苓巴豆霜旋入外為末煉蜜為丸如桐子 黄連四分之一 大以淡薑湯下服如上法己上四方秋冬加厚樸減 巴豆霜分 桂 白豆蔻 天門冬 川鳥頭炮 陳皮 人參錢 惠五 京三棱錢 青皮分五 桔梗

七五女人痕聚滞下 右除巴豆霜茯苓另為末旋入外為細末煉蜜為九 一無時久不已令人喘逆骨疾少氣及治男子內結 厚模製之 澤瀉 全蝎 丁香分五 苦棟 萬瀬 養連 五 競点 美連 致者 巴豆霜分 附子 二新龍古 獨活幾各 玄胡索一战 川鳥頭五 白茯苓 テン 一錢

欽定四庫全書 散聚湯三因治久氣積聚狀如癥瘕随氣上下發作有 時心腹絞痛攻刺腰肠小腹腹脹大小便不利 如桐子大淡鹽湯下服如上法 半夏 茯苓 陳皮 吴茱萸尚洗各大黄 大便利 川芎 甘草矣 杏仁失去 檳榔 表五月月 炒 炒皮 厚樸製 附子炮 當歸分三 桂两各二

次三日日 白日 濟生大七氣湯治積聚狀如癥痕隨氣上行發作者時 右叹咀每服五錢水煎 心腹疠痛上氣室塞小腹脹滿 右吹咀每服四錢水煎 青皮各三 蓬术 益智 肉桂 香附子西 陳皮 霍香葉 仁齋直指 甘草炙 桔梗 京三稜 芜

阿魏方 并溪治內積 金次巴尼石電 松傅賽寶丹追與取積神効 送下 右為末用阿魏糊為九如桐子大每二三十九白湯 連翹和半 黑丑 阿魏 錫 五十两取頭士 煮巾柳醋 糖毬子雨 檀處末柳 卷五 兩分二處雷九 黄連六錢 木香 两 所 形 浄 末 二 虚

版定四事全**与** 青皮等末盡後再一用雷圆二用檳榔三用丑末益 再用雷圓末一兩盡再用木香錫灰三稜我术陳皮 煮將熟起手用黑丑末二兩法起次用檳榔末一兩 右件各為細末再用使君子二两鶴風車角各一两 在外陰乾每服三錢四更時候用冷茶吞下復睡至 三味用水二碗煎至一盏用栗米一合布包在藥內 我术品炒多 青皮取木 仁獨直指 三棱酯

ヨリアガスコー 木香檳榔圓猪竹治一切氣帶心腹滿問肠肋膨脹大 丹溪治茶癖方 滞氣並原藥下盡方可用冷水洗面其樂未下寧耐 片時見其樂下再用樂食補之 天明不可洗手洗面吃湯物代取下或蟲或積惡毒 小便結滯不快方見 右為末沙糖水調下 石膏 黄芩 卷五 升麻分等

一段定四事全与 " 保和圓治一切食積方見傷 琥珀膏專貼積塊 謹按丹溪曰氣不能成塊成聚塊乃有形之物爽與 血塊誠然言也何以明之曰左關肝膽之位肝膽藏 右為末用大蒜搗膏和匀貼之 血液右關脾胃之位脾胃藏飲食所以左邊有積則 食積死血而成也在中為痰飲在右為食積在左為 大黃 朴硝 仁齋直指

有積則為疾飲也其理昭矣治法調其氣而破其血 為血塊右邊有食則為食積而其中問則為水穀出 术去血積麥子神勉去酒積香附子枳實去食積幸 消其食而豁其痰是已如木香檳榔去氣積三核莪 雄黃白攀去涎積乾薑巴豆去寒積黃連大黃去熟 牛甘逐去水積山查阿魏去內積海粉碳石去痰積 積各從其類也若用羣隊之藥分其藥勢則難取効! 人之道路五志之火薰蒸水穀而為痰飲所以中間

たこのうここう 使之不爾反有所損要在臨時通變也 雖要認得分明是何積聚魚見何證然後增減斟量 仁僻直指 圭

